

承諾書

1. バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を他人に譲渡したり、無償提供したり致しません。
2. バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を処方量より多く服用することは致しません。
3. 他院で処方されている薬、注射薬はすべてバイアグラ・レビトラ・シアリス処方医に知らせます。また追加もしくは変更になった場合もすぐに知らせます。
4. 定期的の内服している薬剤がある場合は、その処方医にバイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用の事を知らせます。
5. 新しい薬の処方または注射を受ける場合は、その処方医にバイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用の事を知らせます。
6. 救急の場合にもバイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用の事実を必ず関係者に知らせます。
7. 指示に従って定期的に健康診断を受け、心臓や血圧に異常がないことを確認します。
8. 降圧剤、亜硝酸剤、血小板凝集抑制剤などと併用してバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用すると危険性の高い事を理解しました。
9. 糖尿病、高血圧、心疾患等で危険性が高いことを理解しました。
10. バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを危険防止のため、パートナーまたは家族に知らせます。
11. バイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用後、24 時間以内に他のバイアグラ・レビトラ錠を服用しません。
12. 勃起に関与する血管や神経に大きな障害がある場合や、ストレス等で大脳の性中枢に興奮がおきない場合には 効果が期待できないことを理解しました。
13. 副作用として、頭痛、顔面高潮、消化不良、鼻うっ血、下痢、めまい、発疹、視覚異常等がある事を理解しました。またこれ以外にも副作用として出る事もありますので服用後、何か異常を感じたら直ちに病院へ問合せる事を約束 します。
14. 興味本位の本剤の使用は避けるべきで、使い続ければ本剤なしには勃起できなくなる可能性がある事、また本剤は精力増強剤ではない事を理解しました。
15. 性行為の 1 時間前に服用し、食後に飲むと効果が遅く、うすいので空腹時に飲んだ方が効果が良い事を理解しました。
16. バイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用後に 4 時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師の診察を受けます。
17. バイアグラ・レビトラ・シアリス錠の使用後は高い所での作業、自動車や機械の運転操作には注意します。

以上の項目に同意します。

平成 年 月 日

お名前
